Tipo de TB	Tratamiento / Esquema	Fase intensiva	Fase de continuación	Duración total
Infección por TB latente (ITB / TPI)	Isoniacida + Rifapentina (3HP)	—	—	**12 semanas (1 dosis semanal)**
	Isoniacida sola (6H)	—	—	**6 meses (diario)**
TB sensible	**2HRZE / 4HR**	2 meses: H + R + Z + E	4 meses: H + R	**6 meses**
TB resistente a isoniacida (TB-Hr)	Rifampicina + Etambutol + Pirazinamida + Fluoroquinolona	2 meses	4 meses	**6 meses**
TB resistente a rifampicina (TB-RR)	Esquema para TB-MDR (todo oral)	4–6 meses	5–9 meses	**9–12 meses**
TB multirresistente (TB-MDR)	Bedaquilina + Linezolid + Fluoroquinolona ± Clofazimina	4–6 meses	5–9 meses	**9–12 meses**
TB-RR / MDR	Mismo esquema TB-MDR	4–6 meses	5–9 meses	**9–12 meses**
TB pre-XDR	Bedaquilina + Linezolid + otros fármacos de segunda línea (sin FQ)	Variable	Variable	**12–18 meses**
TB-XDR	Esquema individualizado con fármacos del grupo A y B	Variable	Variable	**≥18 meses**
TB extrapulmonar (no grave)	2HRZE / 4HR	2 meses	4 meses	**6 meses**
TB extrapulmonar grave (meníngea, miliar)	2HRZE / 7–10HR + corticoides	2 meses	7–10 meses	**9–12 meses**